N°. 23 anevrisme de l'artère poplitée

Le nommé Pierre Aselin fort et vigoureux, d'un temperament sanguin, eut à l'age de 30 ans, au côté interne et moyen du bras gauche et sur le Ligament inter-musculaire interne une tumeur de la grosseur d'un petit pois; elle était adhérante profondement, libre sous la peau et sans douleur, au bout d'un mois Cette tumeur augmenta insensiblement et devint douloureuse pendant quelques instans. Deux mois et demi après Le malade ayant fatigué, la douleur augmenta, et il survint du gonflement au bras et à l'avant-bras. on y appliqua Les suppuratifs, dont l'application fut suivie de trois ouvertures auprès de la tumeur, d'où il sortit beaucoup de Pus épais, grisâtre, et mêlé de filets de sang. il guérit six semaines après.

A l'âge de 36 ans, il eut au visage une dartre vive, qui, ayant été repercutée par l'application d'un onguent vert fourni par un Charlatan, fut suivie de douleurs Rhumatismales à chaque côté de la poitrine et du Ventre.

a 45 ans Ces douleurs se firent ressentir profondement au côté externe de la Cuisse droitte, durerent 18 mois, et se transporterent à la poitrine avec suffocation après l'usage de deux bains domestiques, d'où elles repasserent à la cuisse après deux saignées. elles ont cédé à l'usage des tisannes sudorifiques et des bains chauds; et le malade s'est bien porté pendant l'espace de 6 ans, ou jusqu'à sa 51e année.

ARC 54
n° 25

Alors il s'est apperçu au milieu du Jarret droit, d'un
bouton mobile, insensible, et de la grosseur d'un pois.
Le Malade l'ayant pressé avec ses doigts, il devint
douloureux le lendemain et sans pulsation: il augmen-
-ta ensuitte insensiblement avec des douleurs très vives,
~~[illegible]~~ et acquit au bout d'un mois le volume et la
figure d'une moitié d'oeuf de pigeon, devint moins
sensible et toujours sans pulsation. on y appliqua
sans succès les Emolliens, les Résolutifs et les bains
de Marc de Raisins: la tumeur devint ovalaire de haut
en bas, du volume d'un petit oeuf de poule, et fut
accompagnée de pulsation aux côtés du jarret, ou de
palpitations dans les muscles d'autant plus considérables
que les douleurs étaient plus vives. Le Jarret n'était pas
engorgé, la jambe pouvait s'étendre et se fléchir
aisément, et le malade marchait avec peu de gêne.
Un Medecin lui ayant conseillé de garder le lit et
de tenir sa jambe continuellement fléchie; le Jarret
s'est engorgé et dès ce moment il n'a plus été
possible d'étendre la jambe. La tumeur a disparu,
on a senti entre les tendons du biceps femoral
et des demi-nerveux et Membraneux un fluide qui
cedait aux doigts quand on le pressait fort et long-
-tems et qui suivait la main aussitôt qu'on cessait
de presser; il y avait pulsations ysochrones à la
Circulation, et palpitations aux côtés du Jarret.
Les Bains de Vapeurs et les astringens ont été
appliqués sans aucun effets. il survenait à la
jambe un petit Oedème vers le soir, et il se

dissipait pendant la nuit. Une compression faite
pendant 15 jours a augmenté l'engorgement du
Jarret et L'Oedêmatie dela jambe. Les
emplastres de dyachilon gommé et Les cataplas-
-mes suppuratifs ont encore augmenté cet
engorgement ainsi que l'Oedêmatie dela jambe,
qui est actuellement considérable. Les palpitations
des côtés du Jarret ne sont plus sensibles, on ne sent
plus celles du milieu qu'en pressant un peu fort.

Académie Nationale de Médecine Bibliothèque